

# Amígdalas: ¿Cuándo el paciente debe ir a cirugía?



Examen médico: Cuando el niño presenta varios episodios de infecciones de garganta, infecciones bacterianas a repetición, debe consultar con el otorrino.

“Los niños acuden a los consultorios por episodios de dolor de garganta que suelen ser en la mayoría de las veces por causas virales y en algunos casos son de origen bacteriano y requieren del uso de antibióticos. Cuando el niño presenta varios episodios de infecciones de garganta, infecciones bacterianas a repetición, debe consultar con el otorrino. Probablemente el pediatra ya se dé cuenta que es un criterio para llevar a cabo una cirugía de amigdalectomía, que es la extirpación quirúrgica de las amígdalas, porque ya se consideran unas amígdalas con infecciones a repetición, por lo tanto, ya pasa a un caso quirúrgico”.

Explicó que el germen que está involucrado en estos casos es

el estreptococo del grupo A, y suele formar una biopelícula sobre la superficie de las amígdalas, “entonces está ahí, y se reactiva en cualquier momento por lo cual se desencadenan infecciones a repetición, entonces la solución es retirar las amígdalas para evitar tener esas infecciones” explicó el médico.

Estas infecciones se pueden ver a partir de los tres años, y no siempre la solución es la cirugía. Si las infecciones son virales y no son muy cercanas las escenas de infecciones una entre otra, los pacientes no son candidatos para que se les practique la cirugía.

### **El tratamiento**

Es antibioticoterapia para eliminar los cuadros infecciosos, pero en caso de que sea reiterativa esta infección de garganta, una revisión por el otorrinolaringólogo es más que importante para decidir si el paciente ingresa o no a cirugía.

“Si se presentan casos agudos pueden acudir a la urgencia de pediatría y ahí se les ofrece un tratamiento de urgencias, por protocolo del Hospital, los niños deben pasar primeramente por el servicio de urgencias pediátricas y luego, cuando los antecedentes son reiterados, se les deriva al otorrino y puede programarse una cirugía ya que esta cirugía no es de urgencias”, concluyó el Dr. Tornaco.